

2013 - 012981

Aloite 6.-9.-luokkalaisten tyttöjen informoinnista ja vanhempien suostumuksesta HPV-rokottamisen yhteydessä

Marraskuussa kuluvana vuonna aloitetaan Helsingin koulujen terveydenhuollossa 6.-9.-luokkalaisille tyttöjen rokottaminen nk. HPV-rokotteella. Rokote annetaan kohdunkaulan syövän torjumiseksi.

Rokotusohjelma aloitetaan, vaikka ei ole olemassa yhtään tutkimusta, joka osoittaisi, että HPV-rokote estäisi syöpää. Myöskään rokotteen pitkäaikaisvaikutuksista ole mitään tietoa. Kaiken lisäksi yli 90 prosenttia HPV-infektion saaneista naisista paranee itsestään.

Nämä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Antti Heikkilän esittämät näkemykset vahvistetaan myös Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL).

THL:n lääkäri Hanna Nohynek myöntää, että rokotteen tehosta kohdunkaulasyöpää vastaan ei ole suoraa näyttöä, koska syövän kehittyminen kestää 10-20-vuotta. Hän vahvistaa myös, että 90 prosentilla väestöstä virustartunta häviää itsestään, eikä tule enää uudestaan.

THL:n virallisissa suosituksissa ei anneta riittävästi tietoa rokotteen tosiasiallisista vaikutuksista taikka haittavaikutuksista. Viranomaiset kuitenkin tietävät, että eri puolilla maailmaa rokotteen antaminen on kielletty tai kyseenalaistettu rokotteen antamisen jälkeen rokotetuille tytöille tulleiden komplikaatioiden, vammautumisten ja kuolemantapausten takia.

HPV-rokote on tarkoitus antaa tytöille pelkästään rokotettavan tytön omalla suostumuksella. Alaikäisen suostumukseen perustuva terveydenhoito on arveluttavaa kahdestakin eri syystä: Ensinnäkin, lapsen vanhempien velvollisuus - tai mahdollisuus - huoltajana vastata lapsensa terveydestä ei toteudu. Toiseksi, kuinka 12-14-vuotias voisi itsenäisesti päättää sellaisesta asiasta, josta jo ammattilaiset ja viranomaisetkin ovat eri mieltä.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että Helsingin kaupunki ohjeistaa Helsingin terveydenhuollon ammattilaiset ja kouluterveydenhuollon henkilöstön informoimaan ennen HPV-rokotteen antamista vanhempia ja rokotusohjelman kohteena olevia tyttöjä kirjallisesti ja suullisesti seuraavista asioista:

1. Cervarix rokotteen arvellaan estävän vuosittain noin 120 naisen kohdunkaulan syöpä Suomessa.
2. Cervarix ei välttämättä suojaa kaikkia rokotettuja HPV-16 ja HPV-18-infektion aiheuttamilta syövän esiasteilta ja syöviltiltä.
3. Cervarix ei suojaa niitä henkilöitä, joilla jo rokotushetkellä on ihmisen HPV-16 tai HPV-18 tyyppin aiheuttama infektio. (Kyseisen infektion nuori on voinut saada äidiltään jo syntyessään)
4. Cervarix rokote antaa suojan ainoastaan HPV16 - ja HPV18 - tyyppien, mutta ei muiden yli 100 HPV-tyypin aiheuttamia tauteja vastaan.
5. Rokotus ei korvaa kohdunkaulan seulontoja (nk. papa-seulontoja), jotka ovat edelleenkin ratkaisevan tärkeitä syövän kehittymisen ehkäisyssä.
6. Rokotteen aiheuttamat vakavat, pysyviin vammautumisiin ja jopa kuolemaan johtavat haitat eivät ole poissuljettavissa olemassa olevan tutkimusnäytön perusteella.

Lisäksi ehdotan, että Helsingin kaupunki ohjeistaa terveydenhuollon ja kouluterveydenhuollon henkilöstön pyytämään rokotettavan tytön kaikilta huoltajilta etukäteen kirjallisen suostumuksen.