

Päivämäärä Datum

Nimi Namn	Luokka Klass	Valokuva Foto
Huoltaja Vårdnadshavare	Puh. Tel.	
Huoltaja Vårdnadshavare	Puh. Tel.	
Diabeteksen hoito koulupäivän aikana Diabetesvården under skoldagen		
Verensokerin mittaussajankohdat koulupäivän aikana Tidpunkterna för blodsockermätning under skoldagen		
Tavoitearvo Riktvärde	Matala Lågt	Korkea Högt
Tarvitsee apua mittauksessa ja/tai tulkinnassa Behöver hjälp vid mätning och/eller tolkning	<input type="checkbox"/> Kyllä Ja <input type="checkbox"/> Ei Nej	Auttajat Assistentter
Matalan verensokerin tyypilliset oireet Typiska symtom vid lågt blodsockervärde	Toimenpide Åtgärd	
Korkean verensokerin tyypilliset oireet Typiska symtom vid högt blodsockervärde	Toimenpide Åtgärd	
Insuliinimäärä Insulinmängden	<input type="checkbox"/> Kynä Penna <input type="checkbox"/> Pumppu Pump	Tarvitsee apua Behöver hjälp <input type="checkbox"/> Kyllä Ja <input type="checkbox"/> Ei Nej
Hiilihydraattien laskeminen Räkning av kolhydrater		Auttajat Assistentter
Tarvitsee apua Behöver hjälp <input type="checkbox"/> Kyllä Ja <input type="checkbox"/> Ei Nej		
Diabeteksestä tiedottaminen koulussa Informering av diabetes i skolan		
<u>Liian matala verensokeri För lågt blodsockervärde</u>		
<p>Verensokerin laskiessa liian alas lapsi voi mennä tajuttomaksi ja kouristaa. Aseta tajuton lapsi kylkiasentoon ja soita ambulanssi hätänumerosta 112. Älä syötä tai juota tajutonta. Ensiapuna voit sivellä hunajaa/siirappia posken limakalvolle tai ikenien ulkopinnalle.</p> <p>Vid för lågt blodsockervärde kan eleven förlora medvetandet och få kramper. Lägg ett medvetslöst barn i framstupa sidoläge och ring ambulans på 112. Ge inte dricka eller mat åt en medvetslös. Som första hjälp kan du pensla honung/sirap på munnens slämhinnor (kinden eller tandköttet).</p>		
Yhteystietoja Kontaktuppgifter		
Luokanopettaja Klasslärare	Rehtori Rektor	Iltaapäiväkerho Eftermiddagsklubb
Koulunkäyntiavustaja Skolgångsassistent	Kouluterveydenhoitaja Skolhälsovårdare	Diabetespoliklinikka Diabetespolikliniken