

GASTROSKOPI ELLER UNDERSÖKNING AV MAGSÄCKEN

Syftet med gastroskopi är att ta reda på orsaken till dina magbesvär.

Gastroskopi genomförs med hjälp av ett böjligt endoskop som förs in via munnen ner till magsäcken och vidare till början av tunntarmen. Vid behov bedövas svalget med en bedövande spray. Det tas i regel prov av det undersökta området. Provtagningen är smärtfri.

Gastroskopi tar 10–15 minuter.

Vänligen avboka tiden senast en vecka före undersökningen om du inte kan komma till undersökningen.

Att beakta före gastroskopi:

- Diabetes med insulinbehandling: ta vid behov kontakt med diabetessköterskan
- Ifall du använder blodförtunnande mediciner, t.ex. Marevan, Plavix, Pradaxa, Klexane, Fragmin, kontakta endoskopienheten eller iaktta följande anvisning:

Läkemedelspaus _____ INR _____ eller enligt skild anvisning.

Förberedelser inför gastroskopi

- Du ska **inte äta från och med kl. 24 den föregående kvällen och inte dricka 4 timmar före gastroskopi**.
- Ifall gastroskopi sker efter kl. 12 kan du äta en frukost i **flytande form** (t.ex. välling, drickbar yoghurt, saftsoppa) **minst 6 timmar** före gastroskopi.
- Du kan ta dina regelbundna mediciner normalt med lite vatten **senast 4 timmar före gastroskopi** (inte diabetesmediciner).

Undersökningsresultaten får du av den remitterande läkaren 5–6 veckor efter gastroskopi, om inget skilt avtalas.

Malms inremedicinska poliklinik

Igelkottsgränden 3
00800 Helsingfors
09 310 67269
Må–to kl. 8–11 och 12–14.30
Fr kl. 8–11 och 12–13

Dals inremedicinska poliklinik

Läkaregatan 8 L, 4. vån.
00250 Helsingfors
09 310 46194
Må, on, to kl. 8.15–11 och 12–14
Ti kl. 9–11 och 12–14, fr kl. 8.15–11 och 12–13