



KLAMYDIA POTILASOHJE

Klamydia on bakteerien aiheuttama limakalvokosketuksessa tarttuva sukupuolitauti. Se on usein oireeton (naisista 75 % ja miehistä 50 %). Jos se aiheuttaa oireita, tavallisimmat ovat

- naisella
 - valkovuoto
 - kirvely virtsatessa
 - alavatsakivut
 - kuukautisvuotohäiriöt
- miehellä
 - virtsan kirvely
 - vuoto virtsaputkesta
 - lisäkivestulehdus

Samanlaiset oireet voivat johtua myös muista syistä. joten oireiden perusteella ei diagnoosia voida tehdä. Oireet ilmenevät aikaisintaan viikon kuluttua tartunnasta. Hoitamattomana klamydia voi levitä osalla tartunnan saaneista sisäsynnyntulehdukseksi ja näin aiheuttaa lapsettomuutta.

Klamydia voidaan todeta:

- ensivirtsanäytteestä tai
- mieheltä virtsaputken suulta pumpulitikulla otetusta näytteestä
- naiselta virtsaputken suulta tai kohdunkaulan kanavasta pumpulitikulla otetusta näytteestä

Koska klamydia on bakteeri, sen hoitona käytetään antibiootteja. Tavallisimmin käytetään kerta-annoksena atsitromysiinitabletteja. Taudin oireettomuuden vuoksi myös oireettomat seksikumppanit pitää tutkia ja tarvittaessa hoitaa. Vakituisen kumppanin hoito toteutetaan mahdollisimman samanaikaisesti edestakaisen tartuttamisen estämiseksi.

SELIBAATTI (pidättäytyminen sukupuoliyhdyntästä) 7 VUOROKAUTTA LÄÄKITYKSESTÄ !!!

Kondomiehkäisyä suositellaan jälkitarkastukseen asti. Klamydian hoidon onnistuminen on hyvä varmistaa hoidon jälkeen 4 viikon kuluttua otetulla näytteellä.

Antti Iivanainen
terveysasemien johtaja
Terveysasemat-osasto

Hannele Kotilainen
kaupunginepidemiologi
Epidemiologinen yksikkö