



KONDYLOOMA POTILASOHJE

Kondylooman aiheuttajana on ihmisen papillomavirus (HPV), joita tunnetaan lukuisia eri tyyppinä. Kondylooman aiheuttajavirukset kuuluvat ns. matalan riskin virustyyppisiin. Tiedetyt ns. korkean riskin virustyyppit voivat altistaa kohdunkaulan solumuutoksille.

Papillomavirus tarttuu limakalvokontaktissa. Itämisaika vaihtelee 1 -12 kk. Tartunta on valtaosalla ohimenevä ja oireeton eikä vaadi mitään toimenpiteitä.

Kondyloomat esiintyvät yleensä ihonvärisiä syylämäisinä muutoksina ulkoisten sukuelinten alueella. Joskus ne saattavat kehittyä kookkaiksi kukkakaalimaisiksi muutoksiksi. Kondyloomia voi esiintyä myös virtsaputkessa tai peräaukon suulla. Yleensä kondyloomat ovat oireettomia.

Kondyloomien toteamiseksi ei ole olemassa laboratoriotestiä. Naisilla papa-kokeessa voidaan todeta HPV:n aiheuttamia muutoksia. Yleensä kondyloomat on helppo todeta tyypillisen ulkonäkönsä perusteella lääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä vastaanotolla.

Kondyloomia voidaan tarvittaessa poistaa useilla erilaisilla menetelmillä.

Tavallisesti aloitetaan potilaan itsensä kotona toteuttamalla lääkeliusotai voidehoidolla. Lääkepaukkauksien oheita on syytä noudattaa. Lääkärin vastaanotolla voidaan kondyloomia myös jäädyttää(kryo-hoito) tai polttaa laserilla.

Hoitovalinnasta riippumatta kondyloomien uusiminen on tavallista. Itse virusta ei näillä paikallishoidoilla voida poistaa. Valtaosa pääsee viruksesta eroon 1-2 vuoden kuluessa.

Antti Iivanainen
terveysasemien johtaja
Terveysasemat-osasto

Hannele Kotilainen
kaupunginepidemiologi
Epidemiologinen yksikkö