



KUPPA ELI SYFILIS POTILASOHJE

Kuppa eli syfilis on Treponema pallidum-bakteerin aiheuttama sukupuolitauti. Se todetaan verikokeessa, joka on luotettava 1-2 kuukauden kuluttua tartunnasta.

Paitsi seksikontaktissa, kuppa voi tarttua myös raskauden aikana äidistä sikiöön.
Hoitamattomana kuppa tarttuu kahden vuoden ajan tartunnasta.

Kuppa voi aiheuttaa ensioireenaan aritamattoman haavan yleensä sukuelinten alueelle. Haava paranee itsestään ja voi jäädä potilaalta huomaamattakin.

Hoitamaton kuppa etenee vaiheittain ja on välillä oireeton. Vuosien kuluttua kuppa saattaa aiheuttaa keskushermosto-oireita.

Suomessa kuppa luokitellaan yleisvaarallisten tartuntatautien joukkoon. Tartuntatautilaki velvoittaa potilaan hoitoon ja verikoeseurantaan taudin paranemisen varmistamiseksi. Seksikumppanit on ehdottomasti tutkittava. Kupan hoito ja lääkkeet ovat potilaalle maksuttomia.

Kupan hoitona on ensisijaisesti päivittäiset penisilliinipistokset 10-21 vuorokauden ajan. Penisiliiniallergisille henkilöille on olemassa muita hoitovaihtoehtoja.

Kuppahoidon aikana kaikki seksimuodot ovat kiellettyä. Hoidon jälkeen suositellaan kondomin käyttöä ensimmäiseen verikontrolliin saakka.

Hoidon päättymisen jälkeen potilaasta otetaan seurantaverikokeita 1, 3, 6 ja tarvittaessa 12 kuukauden kuluttua.

Teidän hoito- ja seurantasuunnitelmanne on seuraava:

Hoito alkaa:

Hoito päättyy :

1. seurantaverikoe 1kk:n kuluttua:
2. seurantaverikoe 3kk:n kuluttua:
3. seurantaverikoe 6kk:n kuluttua:

Antti Iivanainen
terveysasemien johtaja
Terveysasemat-osasto

Hannele Kotilainen
kaupunginepidemiologi
Epidemiologinen yksikkö