



TIPPURI (GONORRHEA) POTILASOHJE

Tippuri on bakteerin aiheuttama limakalvokosketuksessa tarttuva sukupuolitauti. Se on Suomessa melko harvinainen ja tartunnoista puolet tuodaan ulkomailta (yleensä Kaukoitää, Venäjä). Tippuri aiheuttaa miehille virtsaputkessa lähes aina runsaan märkäisen vuodon, joka alkaa useimmiten 2-7 vuorokauden kuluttua tartunnasta. Emättimeen, peräsuoleen tai nieluun saatu tippuritartunta on sen sijaan usein oireeton.

Tippuritartunta voidaan todeta ensivirtsanäytteestä. Positiiviset löydökset varmistetaan kuitenkin tippuriviljelyllä, jossa määritetään tippurikannan herkkyys hoidossa käytettäville antibiooteille. Tippurinäyte voidaan ottaa myös virtsaputkesta, nielusta, peräsuolesta sekä kohdunkaulakanavasta, riippuen siitä, mihin tartuntamahdollisuus on ollut.

Tippurin hoitona käytetään antibioottia kerta-annoksena joko pistoksena tai tablettina. **SELIBAATTI (PIDÄTTÄYTYMINEN SUKUPUOLIIHDYNNÄSTÄ) 7 VUOROKAUTTA LÄÄKITYKSESTÄ !!!**

Jälkitarkastus tippurihoidon jälkeen on tärkeää paranemisen varmistamiseksi. Myös oireettomat seksikumppanit täytyy tutkia.

Antti Iivanainen
terveysasemien johtaja
Terveysasemat-osasto

Hannele Kotilainen
kaupunginepidemiologi
Epidemiologinen yksikkö