



BRÖDBAGGE

Vuxen: 3 mm

Larv: 3 mm

Som vuxen är brödbaggen rostbrun och tätt behårad.

Larven är nästan vit och har stjärten böjd i båge.



TYSK KACKERLACKA

Vuxen: 8–13 mm

Den tyska kackerlackan är gulbrun, på främre ryggskölden har den två långsgående bruna streck. Bakkroppen täcks helt av vingarna. Känselspröten är långa och trådlika.

Larverna liknar redan när de kläcks de vuxna djuren, men deras vingar är outvecklade.



INDISKT MJÖLMOTT

Vuxen: 14–20 mm

Larv: ca 10 mm

Det fullvuxna indiska mjölmottet har gulgråa framvingar med vingspetsarna i grant rostrött. Även huvudet är rostrött.

Larven är närmast grå, något genomskinlig, med brunt huvud.

SILVERFISK



Vuxen: ca 12 mm

Silverfisken (kallas också nattsmyg) saknar vingar, den är spolförmig och sil-
verglänsande. Känselspröten är långa och i stjärtspetsen har den tre ganska
långa spröt.

Silverfisken trivs på fuktiga ställen i bostaden, t.ex. i kök, badrum och nära
avloppsbrunnarna. Den kan hålla sig under t.ex. plattor och kakelskivor, gärna
också i de rörkanaler som går mellan bostäderna. Silverfisken rör sig i mörkret
och när man tänder ljuset rusar den snabbt och gömmer sig. Den äter vad
som helst av organiskt ursprung. Bl.a. sätter den i sig tapeter och tapetklister.

Det är rätt allmänt att en och annan silverfisk syns, men blir de många kan
det vara ett tecken på fuktskador i byggnadens strukturer, för silverfisken äter
gärna mögelsvamp och dess mycelier.

Bekämpning

- Håll de våta rummen (badrum, kök etc.) så torra som möjligt. Du kan
t.ex. ta till vana att lämna duschdörren öppen, så torkar duschrummet
bäst. Var noga med tillräcklig ventilation.
- Städa regelbundet. Glöm inte avloppsbrunnarna. Tät omsorgsfullt de
hål där rörledningar går genom väggarna.
- Håll emellanåt kokande vatten i avloppen. Om det behövs kan du an-
vända aerosol mot skadeinsekter, följ instruktionerna noga. Håll sedan
en paus i ett par dagar och följ med situationen. Upprepa behandling-
en om det fortfarande förekommer silverfiskar. Räcker det inte med de
åtgärder du själv kan göra, är det bäst att kontakta disponenten eller
ett skadedjursbekämpningsföretag.





SVART TUVMYRA



Vuxen: ca 4 mm

Den svarta tuvmuran är den av våra myrarter som oftast förekommer även inomhus. Dessa svarta myror visar sig särskilt ofta om våarna och somrarna när de tar sig in i husen på jakt efter ätbart. De svarta tuvmyrornas kolonier är vanligtvis i marken, under stenar och trädgårdsplattor.

Dessa svarta myror gör i allmänhet ingen större skada, om de inte förekommer i stora mängder inomhus. Om deras koloni är i själva husets strukturella delar, behöver du normalt proffshjälp för att få bukt med dem.

Bekämpning

- Ta reda på varifrån myrorna kommer. Myror rör sig vanligen längs speciella invanda myrstigar, så genom att följa med hur de går kan du ofta få reda på stället där de tar sig in och ut. Förstör eventuella förorenade matvaror och förvara de övriga livsmedlen i täta burkar eller påsar.
- Börja giftbehandlingen med insektspray eller någon annan produkt som anges vara mot myror. Det finns också myrbekämpningsmedel för utomhusbruk. De kan efterfrågas i järnhandlar eller i större varuhus. Gör behandlingen enligt anvisningarna på förpackningen. Håll sedan en paus i ett par dagar och följ med situationen. Upprepa behandlingen om det fortfarande förekommer myror. Räcker det inte med de åtgärder du själv kan göra, är det dags att kontakta disponenten eller ett skadedjursbekämpningsföretag.

FARAOMYRA



Vuxen: 1,5–2 mm

Faraomyran har spritts över världen från Afrikas tropiska delar. De här myrorna är små och gulaktiga och man måste titta efter noga innan man ser dem. De kan finnas i stora mängder i en bostad, och oftast har de flera bon. Faraomyrorna trivs utmärkt där det finns jämn värme och fukt, samt vatten och näring till hands. Myrorna äter all slags föda.



När faraomyrorna samlas i elektriska apparater som tv-apparater, datorer eller kaffekokare, kan de orsaka kortslutningar. De tar sig in, också om kanterna är tätade. De trivs med värmen och de söker sig gärna till fjärrvärmekanaler. Längs dem tar de sig lätt från en byggnad till en annan. Bekämpningen av faraomyror är en sak för experter.

Bekämpning

- Kontakta disponenten eller något företag som utrotar skadeinsekter.

BYLLEÄNGER



Vuxen: 2–4 mm

Larv: 5–6 mm

Bylleängerns allmänna färg varierar från mörkbrunt till glänsande svart. Ytan täcks av hår som är dels svarta, dels guldbruna. Täckvingarnas innersta delar har vanligen ett ljusbrunt, ibland gulaktigt snett streck.

Larven är hårig, på ryggsidan ljusbrun och den ser tvärstrimmig ut. Stjärtspetsen har en rätt lång tofs av hårstrån.





OBS!
Äter även
livsmedel

STOR MJÖLBAGGE

Vuxen: 12–16 mm

Larv: ca 30 mm

Stora mjölbaggen är som vuxen storväxt, färgen är svart eller mörkt brun. Den påminner om den svartbruna mjölbaggen, utom att den är mycket större.

Larven är gulbrun och blank. Den är ganska tjock och i stjärten har den två små utstickande tappar.

Den stora mjölbaggen lever i naturen i förmultnande träd, även i fågel- och getingbon och kan ta sig in i husen den vägen.



DAGGFLUGOR



Vuxen: 2–4 mm

Larv: 3 mm

Daggflugorna är små, oftast ljus gulbruna, flygande insekter.

Den mest kända arten är **bananflugan**. En annan nära släkting som påträffas inomhus är **ättiksflugan**.

Daggflugorna får sin näring i form av förskämda vegetabiliska matvaror, särskilt ruttnande frukt. De söker sig också gärna till skvättar av öl eller vin, ketchup, söt sylt, rutten potatis, gurka, köksavfall och ättika.



När dessa flygare förekommer i hushåll kan de ha kommit med frukt som haft flugägg. Dessa ägg är så små att de är svåra att se.

Om somrarna kan också vuxna daggflugor ta sig in genom öppna fönster, och larver kan komma med delvis skämda frukter eller bär.

Daggflugorna förökar sig snabbt, en hona kan lägga upp till 400 ägg i för ändamålet lämpliga matvaror. Larverna växer på några dagar och förpuppar sig. Livslängden, från ägg till vuxen äggläggande individ, är bara 10-14 dagar. Larverna förstör fullständigt det livsmedel som de invaderat.

Bekämpning

- Under flera månaders tid måste all mat som duger åt daggflugorna hållas instängd eller hållas borta.
- Frukt förvaras i påsar.
- Hinken med bioavfall måste tömmas tillräckligt ofta.

OHYRA

Ohyra är benämningen på alla slags insekter som behöver blod i sin näring. Sådana är t.ex. vägglöss, människolöss och loppor. När sådana förekommer i människoboningar har de vanligen kommit med människor, kläder eller stoppade möbler, rentav via fågelbon t.ex. på vinden. Ohyra lever i bostäder, i klädesplagg och på människor i hårbeklädnanden eller på huden. Vanligen leder dålig kroppshygien och dålig städning till bättre betingelser för ohyra. När man påträffar skadeinsekter, ska man vidta omedelbara bekämpningsåtgärder mot dem.

Bekämpning

Vägglöss och loppor

- Om du upptäcker vägglöss eller loppor i din bostad ska du omedelbart kontakta disponenten för att få tag på fackmän som kan påbörja en giftbehandling. Vid behov ska du vända dig till din hälsostation.
- Städa bostaden noga, dammsug också madrasserna och sängarna och tvätta sängkläderna i +60°C. Släng dammsugarpåsen genast.
- Om skadeinsekter inte bekämpas kan de gå vidare till bostaden intill och problemet sprider sig till hela bostadsbolaget.

Löss

- Huvudlössen lever i håret. De behandlas med schampon eller lösningar som fås på apotek. Vid behov ska du vända dig till din hälsostation. Städa bostaden noga, dammsug också madrasserna och sängarna och tvätta sängkläderna i +60°C. Släng dammsugarpåsen genast.
- Klädlössen lever i kläder. Om du upptäcker klädlöss, ska du vända dig till din hälsostation. Städa bostaden noga, dammsug också madrasserna och sängarna och släng dammsugarpåsen genast. Släng också förorenade textilier eller tvätta dem i +60°C. Ta kontakt med disponenten för att få tag på fackmän som kan påbörja en giftbehandling.



VÄGGLÖSS

Vuxen: 5–8 mm

En vuxen vägglus är bred, platt och brunaktig. Vägglöss som inte fått näring på länge är bleka.

I larvstadiet ser de ut som de vuxna, men de är mindre och ljusare.



MÄNNISKOLÖSS

Vuxen: 2,5–3 mm

En vuxen lus saknar vingar. Den är ganska tillplattad, färgen är vit eller grå. Huvudlusen lever bara i huvudhåret. Vid hårstrån, alldeles intill huden fäster den sina knappt 1 mm långa ägg, gnetter. Det är inte känt om huvudlusen sprider sjukdomar, men klädlusen kan sprida fläcktyfus och återfallsfeber. Klädlusen lever i klädesplagg.



LOPPOR

Vuxen: 1–6 mm

Lopporna är glansiga, vinglösa insekter, som lever i däggdjurs och fåglars bon. De är vanligen svarta och tillplattade från sidorna. De är mycket duktiga hoppare.

Loppans larver är vita, de saknar fötter men de har bitande mundelar.

